



Fot 1.. Lasy mieszane i bory na wydmach nadmorskich (2180) - nadmorski bór bażynowy (fot. M. Wierzba).



Fot 2. Fragment boru z chrobotniek reniferowym *Cladonia rangiferina* i chrobotkiem leśnym *Cladonia arbuscula* (fot. P. Jastrzębski).





Fot 3. Bielista siwa *Leucobryum glaucum* (fot. M. Wierzba).



Fot. 4. Płonnik pospolity *Polytrichum commune* (fot. M. Wierzba).





Fot. 5. Torfowiec błotny *Syntrophum palustre* (fot. M. Wierzbą).



Fot 6. Kruszczyk rdzawoczerwony *Epipactis atrorubens* (fot. P. Jastrzębski).





Fot 7. Bażyna czarna *Empetrum nigrum* (fot. P. Jastrzębski).



Fot 8. Tajęża jednostronna *Goodyera repens* (fot. P. Jastrzębski).



Fot 9. Kocanki piaskowe *Helichrysum arenarium* (fot. P. Jastrzębski).



Fot 10. Turzyca piaskowa *Carex arenaria* (fot. P. Jastrzębski).





Fot 11. Płat śnieżyczki przebiśniegu na wariantcie W2 (fot. M. Wierzbą).



Fot 12. Młode okazy wiciokrzewu pomorskiego (fot. M. Wierzbą).





Fot 13. Trzmiel rudonogi *Bombus ruderarius* (fot. P. Jastrzębski).



Fot 14. Mrowisko mrówki rudnicy *Formica rufa* (fot. P. Jastrzębski).



Fot 15. Zalotka większa na wariencie W1 (fot. P. Jastrzębski).




Fot 16. Trzmiel ziemny na wariencie W1/ (fot. P. Jastrzębski).





Fot 17. Trzmieł kamiennik na wiancie W1 (fot. P. Jastrzębski).



Fot. 18. Żaba trawna *Rana temporaria* (fot. M. Wierzb).





Fot 19. Dorosła żaba trawna *Rana temporaria* na wariantcie W2 (fot. R. Wąsala).



Fot. 20. Zaskroniec zwyczajny *Natrix natrix* (fot. M. Wierzba).





Fot. 21. Jeż *Erinaceus* sp. (fot. P. Jastrzębski).



Fot. 22. Żuraw *Grus grus* (fot. P. Jastrzębski).





Fot. 23. Kormoran *Phalacrocorax carbo* (fot P. Jastrzębski).



Fot. 24. Mewa siodłata *Larus marinus* (fot. P. Jastrzębski).





Fot. 25. Mewa siwa *Larus canus* (fot. P. Jastrzębski).



Fot. 26. Kania ruda *Milvus milvus* (fot. P. Jastrzębski).





Fot. 27. Myszolów *Buteo buteo* (fot. P. Jastrzębski).



Fot. 28. Śmieszka *Chroicocephalus ridibundus* (fot. P. Jastrzębski).





Fot. 29. Mewa srebrzysta *Larus argentatus* (fot. P. Jastrzębski).



Fot. 30. Szpak *Sturnus vulgaris* (fot. M. Wierzba).





Fot. 31. Stado czajek *Vanellus vanellus* (fot. M. Wierzba).



Fot. 32. Gęgawa *Anser anser* (fot. M. Wierzba).



Fot. 33. Stado łabędzi krzykliwych *Cygnus cygnus* z młodymi - wybrzeże wariant W1 (fot. A. Urbanek).



Fot. 34. Wielogatunkowe stado mew na plaży - wybrzeże wariant W1 (fot. A. Urbanek)





Fot. 35. Gągoły *Bucephala clangula* - wybrzeże wariant W2 (fot. A. Urbanek)



Fot. 36. Perkoz dwuczuby *Podiceps cristatus* - wybrzeże wariant W2 (fot. A. Urbanek)



Fot. 37. Samica szlachara *Mergus serrator* - wybrzeże wariant W2 (fot. A. Urbanek)



Fot. 38. Mewa siodłata *Larus marinus* - wybrzeże wariant W1 (fot. A. Urbanek).





Fot. 39. Leçaçe nuroğesi *Mergus merganser* - variant W1 (fot. A. Urbanek).



Fot. 40. Gil *Pyrrhula pyrrhula* - variant W1 (fot. A. Urbanek).



Fot. 41. Myszołów włochaty *Buteo lagopus* - wariant W1 (fot. A. Urbanek).



Fot. 42. Czajki oraz kretowiska na wariantcie W1 (fot. P. Jastrzębski).





Fot. 43. Łabędzie nieme i sarny na wiancie W1 (fot. R. Wąsala).



Fot. 44. Gęś na wiancie W1 (fot. R. Wąsala).



Fot. 45. Zgrupowanie łabędzi niemych i kaczek (m.in. krakwa, świstun, krzyżówka) na wariancie W1 (fot. R. Wąsala).



Fot 46. Zauszniki na Bagnie Pogorzelićkim.





Fot 47. Śmieszka i głowienka na Bagnie Pogorzelićkim.



Fot 48. Żerująca para żurawi na wariantcie W1.



Fot. 49. Pustulka żerująca w pobliżu wariantu W1 (nie ujęta w raporcie) (fot. P. Jastrzębski).



Fot 50. Gąsiorek (samiec) na wariancie W2 (fot. P. Jastrzębski).





Fot 51. Zauszniki na Jeziorze Konarzewo (fot. R. Wąsala).



Fot. 52. Perkozy dwuczube na Jeziorze Konarzewo (fot. R. Wąsala).



Fot. 53. Łabędzie nieme na Jeziorze Konarzewo (fot. R. Wąsala).



Fot. 54. Zgryzy bobrowe (fot. S. Šebková).





Fot. 55. Tropy sarny na plaży (R. Wąsala).



Fot. 56. Odchody zająca (R. Wąsala).





Fot. 57. Świeże zgryzy bobrowe (R. Wąsala).



Fot. 58. Kretowisko (R. Wąsala).





Fot. 59. Trop lisa (R. Wąsala).



Fot. 60. Tropy dzika (R. Wąsala).



Fot. 61. Trop jelenia *Cervus elaphus* - wariant W1 (fot. A. Urbanek)



Fot. 62. Lis *Vulpes vulpes* penetrujący zamrożnięty zbiornik wodny - wariant W1 (fot. A. Urbanek).





Fot. 63. Ślady żerowania bobrów *Castor fiber* - wariant W1 (fot. A. Urbanek).



Fot. 64. Schron strzelniczy, w którym poszukiwano hibernujących nietoperzy - wariant W1 (fot. A. Urbanek).





Fot. 65. Tropy wydry na plaży na wariancie W2 (R. Wąsala).



Fot. 66. Kretowiska na wariancie W1. (R. Wąsala).





Fot 67. Miejsce żerowania wydry na wariantcie W2 (R. Wąsala).